

按下工程建设“加速键”

明年我市雨污合流管网将全部清零

本报讯(文/图 记者 刘亚杰)地下管网是城市的重要基础设施。实施雨污分流改造,对于改善城市环境、完善城市功能、增强城市韧性、保障城市安全运行具有重要意义。

“西侧项目于2021年8月25日开工,2021年11月恢复通车;东侧项目于2022年2月22日开工,计划在5月30日完工。”3月12日下午,在昌润路(湖南路—东昌路)雨污分流工程施工现场,项目负责人徐少波向记者介绍。目前,项目正在加快推进,(双侧)累计新建完成污水管道4758米,占工程总量的68%;完成雨水管道3256米,占总量的47.9%,完工后将大大提升城市的排水能力。

中雨就积水,大雨、暴雨就出现“城市看海”现象。之前,由于主城区雨污分流体系不完善,每逢汛期城市排涝面临巨大压力。通过近两年多的建设,城区雨污主干管网建设取得了突破性进展。

记者从聊城市城市管理局了解到,主城区东昌路以北地下管网下游的雨污分流主干网络基本形成,东昌路以南地下管网上游区域实施了二干路、陈口路、聊阳路以及东昌湖周边的南关街、西关街、北关街、镜明路、青年林路、海关路、利民西路等工程,这些管网的建设取得了明显成效。经过地下管网的改造,一大批困扰市民多年的城市积水片区得到整治。如今,中雨不用防,大雨、暴雨可以较快排出,城市内涝得到

历史性治理。

“湖南路(站前街—昌润路)北侧、(昌润路—小运河桥)南侧计划4月22日完工;振兴路(站前街—新水河)计划5月31日完工;花园路(建设路—财干路)计划5月30日完工。”3月12日,记者从市城区雨污分流工作现场会了解到,2022年,市城市管理局正在加快实施昌润路(东昌路—湖南路)东侧、湖南路(运河桥—站前街)、香江路(昌润路—站前街)、育新四街、健康路和前许街、新水河雨污分流改造项目的续建和收尾工作。

市住建局共计划实施雨污分流项目13个,主要包含花园北路、向阳路、振兴西路、聊堂路、海源路等14条道路;道路翻建改造项目4个,具体为建设路(站前街—柳园路)、柳园南路(湖南路—南外环路)、昌润北路(高速—北外环)和湖南路(西外环—德上高速);计划改造雨污合流管网约60公里,新建雨水管网13公里、污水管网19公里,新增泵站两处。

至2025年,我市城市建成区要全部完成现有雨污合流管网改造。不仅在城市主干道,也要实现居住小区、企事业单位、医院、学校等全部建筑区域的雨污分流。在实施市政主次干道雨污合流管网改造时,市住建局将协调属地完成沿线建筑小区雨污合流管网改造,确保在2023年实现全市雨污合流管网全部清零。



昌润路(湖南路—东昌路)雨污分流工程施工现场

■ 编后语

雨污分流 让幸福生活有质感

陈桂芹

雨污分流,让雨水、污水“各行其道”,犹如实施一项手术,使城市大小“血管”全面疏通,运转更安全、高效。

坚持把群众的事当成天大的事,强力推进民生改善,让群众的生活向美好,这个道理质朴又有力。近几年,聊城一年接着一年干,一米接一米推进,一条路又一条路改造,就是在坚持不懈地落实这一承载了众多期待的“民心”工程。

2023年实现全市雨污合流管网全部清零;2025年,我市不仅在城市主干道,还要实现居住小区、企事业单位、医院、学校等

全部建筑区域的雨污分流。没有只动“大动脉”,不管“小血管”,就是这么具体,就是这么细致。雨污分流,夯实城市“里子”,让聊城人民幸福生活更有质感。

不管是地下还是地上,无论是“里子”还是“面子”,聊城持续发力,久久为功,这一“功在当代,利在千秋”的工程,将让城市更有高度、厚度和温度,更具魅力和质感。

这个持续开展的行动实际又有力,正如今年的政府工作报告中所说,这座城市承载着我们的梦想和希望,温暖着我们的岁月和时光。我们要用心用情把她规划好、建设好、管理好,让“里子”更实、“面子”更靓,携手共建美好聊城、共筑幸福生活!

从严从实做好疫情防控工作

抗原检测是什么? 能否替代核酸检测?

解读新冠病毒检测新策略

新华社记者
董瑞丰 徐鹏航

为进一步优化新冠病毒检测策略,国务院联防联控机制综合组日前决定在核酸检测基础上,增加抗原检测作为补充,已制定印发《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》。

什么是抗原检测?自测阳性怎么办?能否替代核酸检测?依据方案,记者采访权威部门专家作出解读。

什么是抗原检测?

病毒是否入侵人体
目前主要有三种方法来检测

核酸检测 抗原检测 抗体检测

属于直接检测病毒的方法

相比核酸检测,抗原检测的速度可以更快,操作也更便捷,但准确度较低,一般用于感染早期。

疫情发生后,多国在公认核酸检测为新冠病毒检测“金标准”的同时,也推广了抗原检测,将之作为一项有效补充。

根据《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》,抗原阳性结果可用于对疑似人群的早期分流和快速管理,选用的抗原检测试剂须经过国家药品监督管理部门批准。

能否替代核酸检测?

国家卫生健康委特别说明,核酸检测依然是新冠病毒感染确诊的依据,抗原检测作为补充手段可以用于特定人群的筛查,有利于提高“早发现”能力。换言之,也就是推进“抗原筛查、核酸诊断”的监测模式。

基层医疗卫生机构

具有核酸检测能力的
应当首选核酸检测

不具备核酸检测能力的
可以进行抗原检测

隔离观察人员和社区居民进行抗原检测,应当认真阅读说明书、规范操作。

抗原阳性结果不作为新冠病毒感染的确诊依据

疑似人群抗原阳性及阴性结果均应当进行进一步的核酸检测。

抗原自测阳性怎么办

不论是否有呼吸道、发热等症状,立即向所在社区(村镇)报告

由社区(村镇)联系急救中心按照新冠肺炎疫情相关人员转运工作指南,将居民转运至设置发热门诊的医疗机构,进行核酸检测

抗原自测阴性但有症状怎么办

尽快前往设置发热门诊的医疗机构就诊,进行核酸检测;如不便就诊,则应当居家自我隔离,避免外出活动,连续5天每天进行一次抗原自测。

阳性人员使用后的采样拭子、采样管、检测卡等装入密封袋一并转运至医疗机构作为医疗废物处置。

制图 宫亮杰

哪些人群适用?

1 到基层医疗卫生机构就诊,伴有呼吸道、发热等症状且出现症状5天内的人员;

2 隔离观察人员,包括居家隔离观察、密接和次密接、入境隔离观察、封控区和管控区内的人员;

3 有抗原自我检测需求的社区居民。
根据方案,社区居民有自我检测需求的,可通过零售药店、网络销售平台等渠道,自行购买抗原检测试剂进行自测。

防疫微课堂

如何选择防疫口罩

本报记者 鞠圣娇

印上各种各样的图案,口罩就变为时尚单品。但,这些口罩安全吗?3月10日,聊城市传染病医院临床药学科主管药师柳源给出了建议。

柳源说,口罩是预防呼吸道传染病的重要防线,可以防止病人喷射飞沫,阻挡含病毒的飞沫核,降低接触者的吸入风险,能够大大降低呼吸道病毒的传播,减少公众交叉感染,保护自身及他人。口罩分为医用口罩、普通纱布口罩、日用防护口罩、工业防尘口罩几类,对预防传染病有效的是医用口罩。

医用口罩又分为一次性医用口罩、医用防护口罩、医用外科口罩、KN级别防护口罩,它们分别有不同的执行标准。有研究对比了医用外科口罩和N95口罩预防流感的效果,结果显示预防飞沫传染佩戴一次性医用口罩或医用外科口罩均可。N95口罩适合在风险较高的地区使用。

“建议市民在购买口罩的时候,一定要关注口罩的分类,不能为了好看就忽视了其防护功能。”柳源说,有的时尚口罩虽然摸起来很厚实,但不能起到基本的防护作用。一些厂家生产的医用口罩也会印上各种图案,市民可以根据外包装上的执行标准、生产许可证号、产品注册证号等信息,选择适合自己的口罩。此外,柳源提醒市民,棉纱口罩、海绵口罩和活性炭口罩对预防病毒感染无保护作用。