

雄安新区 确认发现8座古城遗址

新华社石家庄3月28日电(记者 王文华 张涛 白林)“未来之城”雄安新区境内确认发现8座古城遗址,并在其中发现大量文化遗存,绵延数千年,传承脉络清晰。

记者28日从河北省文物考古研究院雄安新区文物保护与考古工作站了解到,这8座古城遗址分别为南阳遗址、古贤遗址、城子遗址、雄州古城遗址、安州古城遗址、新安古城遗址、郑州城遗址和古州城遗址。

2017年4月1日,河北雄安新区设立。同年5月,雄安新区文物保护与考古工作站揭牌。随即,一支联合考古工作队实施考古前置,对全域1770平方公里进行拉网式文物调查和勘察。

到目前,已开展专题考古10项、基本建设考古23项,勘探面积682万平方米,发掘面积2万多平方米,出土文物4000余件,确认不可移动文物263处,其中包括8座古城遗址。

河北省文物考古研究院团队对南阳遗址及其周边区域进行了考古调查,发现“大南阳”遗址聚落群,面积近18平方公里,文化遗存年代自新石器时代晚期延续至宋金时期,持续近3000年。

通过发掘基本确认南阳遗址主体文化内涵是东周至汉代的燕文化。遗址已发现两座战国城址,这是迄今为止在雄安发现最早的城址遗存。

雄安新区文物保护与考古工作站负责人雷建红说,南阳遗址的考古发现,揭开雄安城市考古序幕,钩沉雄安新区从新石器时代晚期到宋金时期的历史脉络,揭示其深厚的燕文化内涵。

雄安,取雄县、安新县的县名各一字而成,雄县之“雄”出自雄州古城,安新之“安”来自安州古城。

公元959年,后周收复燕云十六州中的郑、瀛两州,以瓦桥关建为雄州,这是“雄”的渊源。公元992年,宋

设立顺安军,后改为安州,这是“安”的由来。


雄州古城遗址在今天的雄县县城,考古勘察表明,古城原南北各有雄伟的砖砌城楼。而今地面上城门楼已无存,但尚有部分城墙残留;安州古城遗址在安新县安州镇,城垣最早是宋代为防御辽兵修筑的土城,明代加固为砖城,清代重修。现存城墙有1.5米至2米高,长二三公里。

这座“未来之城”在大规模建设中为历史遗存“让路”。启动区海岳大街原定规划线穿越南阳遗址保护范围和建设控制地带,根据文物部门意见,海岳大街调整了路线设计,完全避开了南阳遗址。

雄安已确认的8座古城遗址,是汇聚文化交融的结晶。河北大学燕赵文化高等研究院副院长宋少俊说,多元文化在雄安一带碰撞、交融,不断融为一体,造就了雄安“质朴劲勇”的精神气质、“慷慨尚义”的社会风气和“兼容开放”的人文品质。

关注安全 关爱生命——燃气安全

三招教你判断
燃气是否泄漏



燃气泄漏会有类似“臭鸡蛋”的味道

1. 闻臭味

好臭啊!

2. 涂抹洗洁精




涂抹在燃气表、燃气管道、阀门等各连接处

2. 涂抹洗洁精

如有气泡证明有漏气现象

3. 观察燃气表



关闭家中燃气具,在不用的情况下,燃气表的指针仍在移动,可判断燃气有泄漏



新华社发 胥晓璇 作



陕西紫阳 迎来春茶采摘旅游季

3月26日,演出人员在紫阳县第七届“春之茶”茶事系列活动现场进行茶叶推介。

近日,陕西紫阳县26万亩春茶园陆续进入采摘期。当地通过举办内容丰富的文旅活动,吸引游客品茶观景,推动茶旅融合发展。

新华社记者 邵瑞 摄

花粉过敏症患者迎来最难熬时期,专家提示——

别轻易用“以毒攻毒”的防过敏偏方

新华社北京3月28日电(记者 林苗苗)春季,不少花粉过敏症患者迎来最难熬的时期。专家提示,一些患者尝试食用蜂蜜或花粉来预防过敏,这种“以毒攻毒”的民间偏方尚缺乏明确的科学共识,建议患者仍以避免接触过敏原为主要预防手段。

“蜂蜜中含有微量的蜂毒和花粉颗粒,有的花粉过敏患者希望通过少量、循序渐进地服用蜂蜜,‘以毒攻毒’来让身体接纳花粉,减少过敏的发生。”北京大

学人民医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师王旻表示,尽管蜂蜜具有一定的抗过敏作用,但这种方法并没有明确的科学共识。

花粉过敏症通常是由于人体对特定植物的花粉产生过敏反应。据了解,引发花粉过敏的植物以风媒花为主,春季常见的有圆柏、榆树、杨树等,秋季则以蒿草等最为常见,这些风媒花外观往往不是典型的“花朵”,但其花粉量大且随风散播。王旻建议,对于花粉过敏的患

者来说,了解并避免接触过敏原最为重要。

针对食物过敏,也有家长会采取让孩子少量多次接触,“以毒攻毒”实现“脱敏”的做法。北京大学人民医院呼吸与危重症医学科主任医师马艳良并不推荐轻易尝试这种做法。她介绍,花生、鸡蛋过敏通常在儿童时期就会发病并伴随终生,可以造成重度湿疹、特异性皮炎,自行脱敏可能造成危险。她建议,切勿在没有医生指导下自行给孩子喂食

导致过敏的食物。

多运动能改善过敏体质吗?马艳良认为,过敏与遗传和环境等多种因素有关,通常不能根治。多运动可以增强身体免疫力,提高身体抵抗外界过敏原的能力,有助于改善过敏体质,但避免接触过敏原更加重要。建议患者必要时可进行过敏原检测,积极配合医生进行治疗,日常注意做好防护工作,如外出佩戴口罩、护目镜等,来降低过敏发作的概率。